

Грипп птиц (H5N1) – острое инфекционное заболевание домашних и диких птиц различных видов, которое характеризуется поражением дыхательных путей, пищеварительной системы и высокой летальностью (смертностью). Относится к особо опасным инфекциям.

Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывает массовый охват поголовья, имеет широкое распространение – район, область, страна. Болезнь проявляется заторможенностью птицы, снижением яйценоскости. Больная птица жадно пьёт. Перья взъерошены, наблюдается покраснение слизистых оболочек, в носовых отверстиях экссудат, перед гибелью наблюдается посинение (цианоз) гребня и серёжек. Может наблюдаться диарея (понос), помёт приобретает зеленоватый оттенок. Отмечаются судороги, нарушение координации движений, запрокидывание головы, вращательные движения головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители. Лечение больной птицы не проводится. Птица подвергается уничтожению.

В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения заражённых птиц, которые, попадая на растения, в воздух и воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путём и через грязные руки. Следует помнить, что **при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры 70 градусов Цельсия убивает вирус в течение нескольких минут.**

В России вирус высокопатогенного гриппа H5N8 впервые был обнаружен в 2016 году у павших в период весенней миграции диких птиц в ходе активного мониторинга на озере Убсу-Нур в Тыве. Начиная с 2016 года, среди водоплавающих птиц грипп зарегистрирован на территории Республики Тыва, среди домашних птиц – в Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Калининградской и Московской областях, Чеченской Республике.

В Волосовском районе в личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится 17 800 голов.

В целях недопущения распространения заболевания гриппа птиц на территории Ленинградской области Государственная ветеринарная служба рекомендует владельцам крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, занимающимся птицеводством, соблюдать следующие меры профилактики:

- не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами;
- обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам, где останавливается дикая птица;
 - обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
 - запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
- не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным;
 - обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;
 - организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашними птицами, содержать его в чистоте;
 - производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
 - кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.
- Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.

- Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников, воздерживаясь от покупки живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли. Ввоз птицы внутри Ленинградской области необходимо проводить по согласованию с ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района», из других регионов РФ – после согласования с Управлением ветеринарии Ленинградской области.

- Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.
- Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

-Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки (ошпаривание).

- Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.

- Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин, хлорная известь и др.) и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки.

- Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.

- Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.

Справочно:

Заражение человека гриппом происходит при тесном контакте с инфицированной мёртвой домашней и дикой птицей.

Опасны выделения заражённых птиц, которые попадая на растения, в воздух, воду, затем могут заразить человека через питьё или «грязные руки».

Инкубационный период составляет от нескольких часов до 5 дней. Заболевание гриппом птиц начинается с острого озноба, повышения температуры, мышечных и головных болей, болью в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови и отдышка. Затем может возникнуть затруднённое дыхание, поражение печени, почек и мозга. При появлении первых признаков заболевания, необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения.

В целях профилактики заболевания, особенно «маленьким гражданам», необходимо избегать контакта с дикой птицей в лесах, парках и на открытых водоёмах, подвергать тщательной термической обработке продукты птицеводства

При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться к специалистам государственной ветеринарной службы Волосовского района по телефону: 8(813)73-23-078, 8(813)73-23-182, 8-921-439-17-11.